

ARANCIA PIGMENTATA MORO NL 58-8D-1



EPOCA DI MATURAZIONE

GENNAIO 	FEBBRAIO 	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO
LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE 

CARATTERISTICHE DEL FRUTTO

FORMA	ovoidale	SBUCCIABILITÀ	media
PESO	180 gr	COLORE DELLA POLPA	rosso intenso
COLORE BUCCIA	rosso intenso	SUCCOSITÀ	media
BUCCIA	mediamente papillata	SEMI	assenti
SPESSORE BUCCIA	medio		

PIANTA

CARATTERISTICHE AGRONOMICHE

PRODUTTIVITÀ	elevata
ALTERNANZA	presente
PERSISTENZA DEL FRUTTO MATURO SULLA PIANTA	media

CARATTERISTICHE VEGETATIVE

VIGORE	medio
SPINESCENZA	media
PORTAMENTO	assurgente
CHIOMA	compatta

ORIGINE

Clone nucellare della varietà Moro selezionato presso il CRA-Istituto Sperimentale per l'Agrumicoltura di Acireale nel 1958.

GIUDIZIO SINTETICO

Clone tuttora interessante per la pigmentazione intensa della polpa e della buccia. E' la varietà che tradizionalmente alimenta il flusso di esportazione verso i paesi europei.