


## CLEMENTINE NOVA



### EPOCA DI MATURAZIONE

GENNAIO 	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO
LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE 

### CARATTERISTICHE DEL FRUTTO

FORMA	oblata	SBUCCIABILITÀ	media
PESO	170 gr	COLORE DELLA POLPA	arancio intenso
COLORE BUCCIA	arancio intenso	SUCCOSITÀ	media
BUCCIA	liscia	SEMI	numero variabile da 0 a 6
SPESSORE BUCCIA	sottile		

### PIANTA

#### CARATTERISTICHE AGRONOMICHE

PRODUTTIVITÀ	media
ALTERNANZA	assente
PERSISTENZA DEL FRUTTO MATURO SULLA PIANTA	media

#### CARATTERISTICHE VEGETATIVE

VIGORE	medio
SPINESCENZA	assente
PORTAMENTO	assurgente
CHIOMA	compatta

### ORIGINE

Ibrido tra clementine Comune X tangelo Orlando ottenuto in Florida nel 1942.  
In Spagna ha preso il nome di Clemenvilla.

### GIUDIZIO SINTETICO

Negli ultimi anni ha avuto notevole diffusione grazie al sapore gradevole dei frutti. Presenta semi in numero variabile ed è apireno se coltivato lontano da impollinatori. In annate invernali poco piovose e in terreni leggeri e poco profondi i frutti asciugano precocemente. Inoltre è suscettibile alla spaccatura dei frutti.